四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷五

詳校官太醫院御醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣李惟清

聖濟總録纂要卷五

休寧程林纂

瘧疾門

諸瘧統論

論曰夏傷于暑秋成痎瘧該于夏而作也方夏之時陰居于内暑雖入之勢不能動俟得秋氣陽為之動變汗出遇風乃成此疾故名曰痎瘧皆生于風蓄作有時其

氣陰陽上下交爭虚實更作陰陽相移也陽併于陰則陰實而陽虚陽明虚則寒慄鼓頷巨陽虚則腰背頭項痛三陽俱虚則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外皆寒陽盛則外熱陰虚則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲因傷于暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也令人汗空踈腠理開因得秋氣汗出遇風及得之于浴水氣舍于皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝行于陽夜行于陰此氣得陽而外出得陰而

內薄內外相薄是以日作日作者氣之所舍深也作之早晏者隨風腑日下一節也是以或先寒後熱或先熱後寒或但熱無寒或本于痰或本于瘴癘或本于鬼神或本于邪氣大槩外傳經絡內入五臟症既不同治法亦異凡治瘧者不辨陰陽虛實概以吐藥投之有非痰實而真氣受斃者固多其內經論五臟諸經之瘧本以刺法補瀉其寒熱先後與夫正發早晏又皆不同明指邪氣所傳不可一槩而論今備載諸症本末恭以治之

輕重要在隨症而施庶幾乎無一曲之蔽也

寒瘧

論曰寒瘧之狀內經謂先寒而後熱病以時作是也葢傷暑汗出腠理開發因遇夏氣凄滄之水寒其氣藏于皮膚腠理之中秋傷于風則病成矣其症先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去則內外皆熱頭痛飲冷是也

檳榔湯　治寒瘧神効

檳榔 常山 桂心 陳皮去白炒 甘草炙一兩

酒水合煎三錢未發時先服

鱉甲常山酒 治瘧先寒戰解即壯熱

鱉甲醋炙一分 淡竹葉一兩 甘草 常山三分

酒半鍾浸藥一宿次早加水煎未發時温服得吐為效

蜀漆散 治寒瘧

蜀漆水洗去腥焙 雲母火煅一晝夜 龍骨一兩

共末未發時漿水下五分

烏梅丸 治寒瘧不止

烏梅肉炒 桃仁去皮尖炒 常山 豉炒三分 升麻 肉蓯蓉酒浸洗 人參 甘草炙 桂心一兩

共末蜜杵丸桐子大空心酒下二十丸至三十丸

虎骨丸 治一切寒瘧無問遠近

虎骨酥油炙 人參 甘草 桂心 烏梅肉炒五錢 桃仁去皮尖炒 肉蓯蓉 常山 升麻三分 附子五錢 麝香研一錢 豉

合炒一

共末蜜丸桐子大未發時飲下三十丸

二薑散　治寒瘧不差

黑乾薑　高良薑一兩

同炒黑為末空心酒下一錢日三

寒瘧塗方

鼈甲醋炙五錢　烏賊魚骨去甲　附子　常山　炙甘草一兩

酒煎五錢次日以酒塗手足并背上如不發即止發

時飲此酒一鍾

又方

附子一枚生用

為末用酒和塗病人背心上佳

溫瘧

論曰溫瘧之狀內經所謂先傷于風後傷于寒其症則先熱後寒病以時作是也葢風為陽氣寒為陰氣風氣大勝故先熱而後寒得之冬中風寒氣藏于腎內至骨

髓至春陽氣大發邪氣不能自出至夏大暑腦髓爍肌肉消腠理發洩或有所用力邪氣與汗俱出故氣從內之外其法宜先治其陽後治其陰則瘧疾自除

蘆根湯　治初壯熱後寒戰骨節痠疼口乾煩渴

蘆根　石膏一兩　麥冬　升麻　葛根三分　山梔五錢

水煎五錢入竹葉十片未發前連三服

知母湯　治瘧骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解

知母二分　甘草一兩　石膏三兩　桂心五錢　粳米一合

水煎五錢入米一撮候未熱未發時先服

常山飲　治温瘧壯熱微寒

常山如雞骨者五錢　淡竹葉一把　小麥一合

水浸一宿次早煎未發時空心温服　老年久病之人及虛弱者煎三錢服

寒熱往來

論曰陰陽相勝而寒熱互作者以邪氣相并也故氣并於陰則為寒氣并於陽則為熱寒則振慄鼓頷以陰實

陽虛故也熱則渴而飲冷以陰衰陽勝故也

柴胡桂枝湯　治瘧寒熱往來

柴胡四兩　桂枝　人參　片芩　白芍兩半　甘草　半夏一兩

薑棗水煎六錢溫服日二

人參湯　治寒熱瘧時作面色黄

人參　常山五錢　甘草　陳皮去白炒三分

水煎五錢入茶末燈心去滓入酒半鍾未發時先服

取吐如未吐再服以痰盡為度

鼈甲大黄丸　治瘧寒熱往來久不差

鼈甲　大黄生　附子　人參　甘草　常山　蜀漆　白薇一兩

共末蜜丸桐子大竹葉湯平日服十五丸良久又服

癉瘧

論曰癉瘧之狀内經所謂但熱不寒陰氣先絶陽氣獨發少氣煩寃手足熱而欲嘔是也得之邪熱留于身中

厥逆上冲氣實而不外洩因有所用力腠理開疎風寒客于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛不及于陰故但熱不寒氣內藏于心外舍于分肉之間令人消爍肌肉名曰癉瘧以單陽無陰故也

白虎加桂湯　治瘧疾陰氣孤絶陽氣獨發脉微少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏于心外舍于分肉之間令人消爍肌肉

石膏研一兩六錢　知母鹽酒炒六錢　甘草蜜炙二兩　粳米炒半合

用汲水一升煮藥五錢入粳米一撮以米爛為度去滓入桂末三錢再煎取四合作一服稍熱服取汗先寒發熱汗出愈

豉心湯 治殫瘧但熱不寒

豉心一合 雄鼠屎二錢炒 童便三升半 黑山枝三分 柴胡 鼈甲一兩一分 甘草五錢 烏梅肉七枚炒 生地汁二合 生薑汁一分 桃枝心 栁枝心各一把

除鼠糞地薑汁小便將藥入小便浸一宿于星月下

次早煎去滓入鼠屎地薑汁煎分三服一日用

石膏湯　治瘴瘧熱甚不差

石膏研二兩　白粳米五十粒　常山三分

水煎五錢入竹葉二七片空心欲發與正發時各一服靜卧勿與人語俟過發時再洗手面飲食七日内禁房事及酒麪熱物久瘧不過二劑

車前草湯　治瘴壯熱不止渴欲飲水

車前草　常山　生甘草　升麻　大豉炒五錢　粳

米半合

水浸五錢于星月下露一宿上橫刀一把次早五更煎空心溫分二服良久即吐吐定以漿粥止之

常山飲 治瘴瘧但熱不寒煩渴不止

常山 生甘草 烏梅肉炒 青蒿五錢 竹葉二十一片

以童便白酒各一大鍾微煎露星月下一夜上橫刀一把次早空心溫服及當發時各一服以差為度

間日瘧 痰瘧 痎瘧 勞瘧 久瘧 鬼瘧

瘧母

間日瘧

論曰間日瘧者邪氣著于陰不得與陽氣俱出也衛氣晝行於陽邪氣不得出故必再會而後發是以間日乃作

醇醨湯 治間日瘧

大黄炒三分 常山 甘草炙兩半

水煎三錢未發先服

常山酒 同

常山一兩 蒜獨頭者一枚 糯米 黑豆百粒

共粗搗以白酒一升浸上件露星月下一宿上横刀

一口次早煎未發時三分飲一分如未吐更服一分

得吐差

糯米煮散 同

糯米四十九粒 常山 淡竹葉 烏梅肉炒 炙甘草五錢

石膏二兩

共末水煎五錢未發時先服

神聖丸　治間日瘧先寒後熱

黒豆小者二十一粒　白砒一錢細研　大棗三枚飯上蒸去皮核

共研極細須於五月五日或七月七日修合丸如豌豆大丹砂為衣陰乾冷茶清下三丸忌食熱物一伏時　合丸時忌女僧尼姑雞犬

痎瘧

論曰痎瘧之狀胸中不利頭痛振寒怢慄而不能食食

即嘔吐寒去則內外皆熱更作心下支滿痰積胸中氣逆煩嘔故謂之痰瘧

石膏飲　治一切痰瘧

石膏三兩　常山二兩　淡竹葉三兩　生甘草　烏梅肉二兩　粳米半合

水煎五錢空心溫服吐痰差　如熱甚加大黃一兩

犀角散　治痰瘧嘔吐

犀角　升麻　玄參　常山五錢　細辛　甘草生　松

羅　山枝一分

水煎五錢空心徐徐温服取吐痰涎效

痎瘧

論曰痎瘧者以瘧發該時或日作或間日作也夫衛氣流行合于晝夜陰陽邪氣内舍于榮隨衛氣以出入而應于風府其作之早晏皆以時發寒温癉瘧動作亥時故内經統謂之痎瘧其狀伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則内外皆熱頭痛如破渴欲冷飲

麻黄丸　痎瘧發作有時

麻黄去根節一兩　常山　甘草　知母　大黄生五錢

共末密杵丸小豆大未發前空心飲下五七丸臨發再下

鱉甲漬酒　治痎瘧以時發

鱉甲九肋醋炙　附子　甘草一兩　常山二兩　烏賊魚骨去甲二兩

酒三鍾漬藥五錢明早先以酒塗五心次温飲一二鍾

常山酒　治痎瘧先寒戰後壯熱日發及間日作者

常山　淡竹葉一兩　鼈甲醋炙一兩　甘草三分

共粗搗酒浸五錢於星月下露一宿次早水煎未發時先温服取吐效

知母丸　治一切瘧

知母　烏梅肉炒二兩半　常山　肉蓯蓉　豉炒二兩　炙甘草　人參　桂心兩半

共末蜜丸桐子大酒下二十丸

梔虎膏　治瘧瘧

胭脂　阿魏一大豆許同研

入大蒜肉研和為膏用大核桃一枚劈開去仁取一片以藥填核內發時將藥核覆在手虎口上男左女右令藥着肉以帛縛定過宿乃去

勞瘧

論曰勞瘧者以久瘧不差氣血俱虛病雖間歇勞動即發故名曰勞瘧蓋邪氣日深則氣息愈耗表裏既虛故

令人食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也治宜補養氣血

柴胡湯　治勞瘧經久不差

柴胡一兩　人參　黄芪　片芩　甘草　括樓根五錢

薑棗水煎五錢未發時先服日二

祛勞湯　治瘧經年不差寒熱瘻瘦

鼈甲　柴胡　常山　知母　甘草　青蒿　枳殼炒　桂心一兩　木香五錢

薑棗水煎三錢入柳枝心七段葱白三寸煎空心溫
未發先服已發又服

柴胡枳殼湯 治勞瘧經久不差熻熻發熱骨節疼痛
不下食小便赤澀日漸消瘦

柴胡 枳殼 升麻 麥冬 鼈甲 甘草 桃
仁一兩

水煎三錢未發先服日二

常山丸 治積勞寒熱

常山 知母 蜀漆葉 白薇 炙甘草 烏梅肉炒 麥冬 升麻 地骨皮三分 鼈甲 萎蕤五錢 大豉炒一合 石膏一兩

共末鍊蜜丸如小豆大空心飲下十丸未發前再服加丸數以差為度

烏梅丸 治積年虛不差顏色羸瘦無力

烏梅肉炒 人參 桂心 炙甘草 升麻五錢 桃仁去皮尖炒 肉蓯蓉 常山三分 頭微炒一分

共末蜜杵丸桐子大空心飲下二十丸未發前服三十丸

牛膝飲　治瘧經久不差

牛膝生一兩

水煎空心分二服

常山湯　治瘧經年不差

常山　知母　鼈甲　甘草　柴胡　青蒿　枳殼炒　桂心一兩　桃枝心　柳枝心各一把

水煎五錢入葱白薤白各三寸空心溫服日二

烏梅五補丸　治瘧經年不差狀如勞疾

烏梅肉　黄芪　桂心　肉蓯蓉一兩　柴胡　桃仁去皮尖炒　赤茯苓　人參　升麻　川歸酒洗　常山　懷生地一兩　甘草炙兩半　麝香五錢

共末蜜杵丸小豆大空心酒下二十丸加至三十丸

二物湯　治火瘧食少肌瘦

童子小便半升　白蜜一兩

同入磁瓶內煎數沸分三服

久瘧

論曰久瘧者瘧疾經久不差發汗吐下過甚真氣虛耗邪氣深沉以內搏衛氣不應故積歲月而難治雖有虛痞不可攻治當先其發時用湯液以發汗盎浸漬薰蒸邪氣方出出則微汗令小便利者表裏俱和則久瘧自差矣

黄芪散　治瘧四肢虛汗出不止

黃芪 牡蠣 人參 知母 麻黃根各一兩

共末未發前小麥湯空心下三錢未差又服

車前草湯 治久瘧憎寒壯熱不止渴欲飲水

車前草 常山 升麻 甘草五錢 大豉微炒 白糯米半合炒

水浸三錢露星月下一夜上橫小刀一口次早煎空心溫服相次又服良久得吐吐定即食稀粥

枝子湯 治久瘧經年不差

枝子一兩 常山三分 車前子葉炙五錢 粳米半合

水煎五錢空心温服以吐利為度

常山湯 治久瘧不止

常山 烏梅肉炒一兩 生甘草三分

薑水煎三錢空心温服發時再服以差為度

鬼瘧

論曰鬼瘧者外邪之所乘也凡人真氣内虚神守不固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒寒熱更作若有所持而

屢發屢止治宜禳解兼以祛邪安神之劑即愈

獨勝丸　治鬼瘧經久不差

桃仁（大者一枚）

和皮尖劈二片一片書奉勅斬鬼四字一片書奉勅殺鬼四字合作一枚以彩線紮定五更新汲水呑下

三聖丸　治鬼瘧

雄黃　雌黃　大黃（生各一兩）

各研末用井華水浸蒸餅丸小豆大發日清晨取汲

水向東方下二丸宜五日午時修合

阿魏雄黄丸　治鬼瘧經久不差

阿魏　雄黄五錢　栁枝心　桃枝心取向東者各十七寸為末　丹砂一分外一分為衣

共末以三家粽角小豆大丹砂丸為衣癸日用淨器磨一丸塗中指尖上男左女右未退冷水下一丸

瘧母

論曰瘧母者因病瘧久不差結為癥瘕是也邪伏于陰

故也治以破結削瘕之劑陰其病本則瘧自除

鼈肉煎丸　治瘧久不差結為癥瘕名曰瘧母

生鼈肉半斤治如食法　片芩　葶藶子紙炒　柴胡　蜣螂去頭翅足炒五錢　桃仁湯炮去皮尖另研　大黃生　牡丹皮　紫菀　瞿麥穗去梗　半夏湯炮去皮薑汁炒　人參　黑乾薑　大戟　阿膠蛤粉炒　海藻水洗去鹹汁　䗪蟲炒　鼠婦炒去足　紫朴一分　桑螵蛸炒一兩　石韋去毛淨用羊脂炒焦黃　桂心　射干取紫色者用米泔浸一日　赤芍藥一分

共末取竈下灰三升白酒二升用竹籮盛灰以酒淋取灰汁澄清用汁煮鼈肉令爛絞去肉將汁入藥末同煎成膏試可丸即止丸如桐子大未發前空心酒下二十丸

雄黄丸　治遠年瘧結成癥瘕

雄黄醋煮研　丹砂　麝香五錢　鼈甲醋浸炙　白薇　虎頭骨酥炙　木香　羚羊角　知母　烏犀角　麻黄去根節　防風　柴胡　茯神　草龍膽　川歸酒洗　牡蠣

童便淬赤芍藥 猪苓 升麻 檳榔 龜甲醋炙 玄参 烏梅肉 地骨皮洗淨 山梔 川連 安息香 阿魏醋研入麪作餅炙 萎蕤 桃仁去皮尖炒 龍齒各三分

共末入蜜杵丸如梧子大未發時空心飲下二十九臨發再下

瘧疾發熱身黃小便不利 瘧痢 瘴氣 瘴瘧

瘧疾發熱身黃小便不利

論曰寒熱淩瘧于人名為瘧病瘧而發熱小便不利者

身必發黄此葢熱氣下迫入于小腸水道旣澀故小便不利

常山飲　治手足苦煩發熱渴躁通身悉黄小便不利

常山　柴胡　山枝　甘草一兩　石膏　赤茯　蜀漆　鼈甲二兩炒

水煎五錢入竹葉二七片豉百粒

知母湯　治發熱煩渴咽乾口燥身黄怠惰小水澀

知母　升麻　人參　麥冬　柴胡　犀角　地

骨皮一兩 鱉甲 石膏二兩 甘草半兩 赤茯三兩

水煎四錢入豉五十粒

柴胡湯 治大渴煩躁引飲身黃小便不利

柴胡二兩 人參 麥冬 知母 杏仁去皮尖炒一兩 炙甘草五錢

水煎四錢服以利為度

赤茯湯 治發熱煩躁身面黃小便不利

赤茯 片芩 桂心一兩 升麻 甘草 常山

蜀漆炒五錢

水煎五錢服以利為度

赤茯苓湯　同前

赤茯苓　白芍炒一兩　白术土炒三分　木通　瞿麥穗一兩

生薑葱白水煎五錢溫服以利為度

瘧痢

論曰瘧痢者瘧久不差寒熱邪氣內搏腸胃間也其病寒熱往來利下膿血赤白相雜腸中切痛隨其陰陽而

治之

黄連犀角丸　治傷寒病瘧兼痢疾無問下赤白水穀完出及下鮮血并皆主之

川連　犀角　豉（炒二兩）　龍骨（火煅四兩）　牡蠣（醋淬五錢）

共末蜜丸桐子大飲下三十丸日二

前胡丸　治傷寒瘧氣急黄并利

前胡　赤茯苓　片芩　白芍　枳殼（去白炒五錢）　大麻仁（兩半研）　大黄（生一兩）

共末蜜丸小豆大空心飲下十丸以溏利為度又利

服十五丸

瘴氣

論曰傳言瘴氣乃山川毒厲之氣又云江山霧氣多瘴

凡以其氣鬱蒸而然也閱諸方論治瘴氣之法不一或

謂其症與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有

在膈可吐者或以治瘧法治之者葢原廣南山川地形

瘴氣所生之因及春夏之交又瘴氣所起之時與夫人

染瘴氣拯治之法悉著于篇庶可考焉且陽生于子盛于巳陰生于午盛于亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不長而廣南位當巳午則陰陽之氣蘊積于此可知矣天不滿西北地不滿東南西北陰也土地高厚東南陽也地土卑下而廣南屬東南則土地之卑下可知矣以土地卑下而陰陽二氣所蘊積是以四圍之山崇高相環百川之流悉皆歸赴及秋草木不凋瘁冬令蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不散霧露之氣易以傷人此岐伯

所謂南方地下水土弱蒸霧露之所聚也故瘴氣獨盛于廣南然瘴氣所起其名有二孟夏之時瘴名芳草而終于秋孟冬之時瘴名黄芒而終于春四時皆能傷人而七八月間山嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣尤甚當是時疾瘴大作不論老少或因飢飽過傷或因榮衛虚弱或冲煙霧或涉溪澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭疼體痛胸膈煩滿寒熱往來咳嗽多痰全不思食發渴引飲或身黄腫脹眉髪脱落此皆毒厲鬱蒸之氣所致夫生于

湊者安于湊其土人宜無所慮矣然且日食檳榔葢檳榔之性破堅毒除蘊積故耳治法先以磁石下收其陰次以丹砂上正其陽陰陽氣正中滿自消然後以檳榔解其餘蘊毒斯愈矣

磁石丸 治瘴氣下收其陰

磁石三兩醋淬七次

研極細醋煮糊丸小豆大汲水下三十丸日二

丹砂散 治瘴氣上正其陽

丹砂明亮者三兩飛

蜜水下五分旦一服

秦艽湯　治山嵐瘴氣如瘧狀

秦艽　柴胡半分　常山一分　糯米一撮　烏梅肉炒三枚

共作一服水煎半分二服取吐利

元氣十補丸　治傷寒瘴氣人虛弱面黄不思食或困

或省心腹脹滿痞氣耳鳴

巴戟天　肉蓯蓉　白术　石斛　五加皮一兩　鹿

茸去毛酥炙五錢 兎絲子酒煮 人參 栢子仁 甘菊三分

共末蜜丸桐子大空心酒下二十九日二

香椿散　治瘴氣惡心四肢痛口吐酸水不思食憎寒壯熱發過引飲二廣閩中多山嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣當秋七八月之間芒華發時此疾大作俗謂之黃芒瘴又謂之芳草瘴是也葢人或因飢飽或因虛怯或冲煙霧或涉溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟆瘴啞瘴其名不一並皆治之

香椿嫩葉酒浸三兩炙甘草 南壁土取向日者臘茶一兩

共末酒下二錢如患久者加入柴胡甘遂各五錢空心臨卧服

菖蒲散 治瘴氣久治不差

石菖蒲 川芎 白朮炒蒼朮炒香荆芥穗 炒山梔一兩吴茱萸 甘草 硝石 側栢炒黄荷葉五錢

共末用薄荷湯下二錢如患熱疾薑棗煎服

煮黒豆丸 治山嵐一切瘴氣

白术 蒼术 甘草 貫衆二兩

共末蜜丸彈子大用黑豆一合入銚内令平將藥安豆中入水高豆一指許慢火煮乾復暴乾以絹袋盛之用新汲水吞二十粒有患處空心一服如渉遠遇飢水下五十粒至百粒可充飢餒

烏藥湯 治嵐氣一切瘴氣

烏藥炙一斤 半夏半斤薑汁炒 桂心 甘草二兩 馬鞭草半斤

陳皮去白炒 荊芥四兩

薑水煎三錢服

瘴瘧

論曰人與天地流通萬物一氣故有感于山川毒癘之氣而為病者瘴瘧是也以其寒熱相似于瘧故名瘴瘧傳謂兩山夾水多瘴蠱陰氣多而陽氣少則易為寒熱之疾也

白薇湯　治瘴瘧經百日并一年者

白薇　知母　升麻　龍膽草　炙甘草　蜀漆

葉炒 片芩 苦參五錢 常山 大黄微炒一兩 淡竹葉三兩

鼈甲醋炙 豉一合 獨蒜三枚 石膏 赤茯三分

酒水合煎三錢先時及發時各一服仍以藥汁塗手心并面

木香丸 治一切瘴蠱毒等瘧

木香一分 升麻 玄參 猪苓三分 甘草 檳榔 炙

鼈甲 犀角五錢 豉一合炒

共末蜜丸小豆大空心酒下三十丸日二

砒霜丸 治山嵐瘴氣寒瘧解邪毒

白砒一分 瀫花二兩 鐵砧上末四兩水淘淨

共研入麝香少許金銀箔各十片糯糊丸芡實大酒下一丸吐瀉差

常山散 治瘴瘧寒熱往來二三日一發

常山 紫朴一兩 草豆蔻二枚 檳榔 炙甘草五錢 烏梅肉七枚

水煎三錢候冷未發前先服如熱服即吐

保安湯　治瘴瘧久不差

常山　桃仁五錢　知母　青蒿一兩

薑水煎二錢稍熱服

中熱暍　中熱悶絶

中暍統論

論曰盛夏炎熱人多冐涉路途逆熱毒易傷微者客於陽經令人嘔逆頭眩心神懊悶汗出惡寒身熱發渴即時不治乃至熱氣伏留經絡歳久不除遇熱即發俗名暑

氣甚者熱毒入内與五臟相併客邪熾盛鬱瘀不宣致陰氣卒絶陽氣暴亾經絡不通故奄然悶絶謂之中暍此乃外邪所擊真臟未壊若遇藥救氣通則甦但治熱暍不可飲以冷物冷則熱不流通若外以冷觸則熱藴積於内反不得宣發故也

中熱暍

論曰熱暍之病由冐犯暑熱邪氣其脉弦細芤遲其狀汗出惡寒身熱而渴身重疼痛小便已則灑灑然毛聳

四肢厥冷微勞動則熱口開齒燥經所謂脉虛身熱是爲傷暑不可汗下若汗下則惡寒更甚宜以去熱邪藥治之則愈

白虎湯　治中熱喝頭痛汗出惡寒發熱而渴

知母去毛六兩　石膏研一斤　甘草生二兩　糯米六合

水煎五錢空心温服　一方加人參

小香薷飲　治伏暑吐逆中喝

香薷穗二兩　人參一兩　白扁豆炒五錢

水煎三錢空心温服

竹茹湯　治中暍煩渴不止

竹茹一合　甘草一分　烏梅肉二枚

水煎時時細呷愈

消暑散　治中暑煩躁多困乏力

人參　白麪一兩

共末空心汲水下二錢

甘露散　治暑氣

川連一兩　吴茱萸五錢洗

同炒茰黑色地上去火毒去茰用連為末食後茶清或

汲冷水下五分

甘露丸　治中暑熱躁悶

寒水石（火煆放井中浸七日研四兩）　天竺黃　馬牙硝（二兩）　生甘

草（一兩）　氷片（研五錢）

共末糯米粥丸茰實大薑蜜水下一丸

救生散　治中暑毒煩躁渴悶

脂麻（新者三兩慢炒黑色）

為末用新汲水下三錢以差為度凡暑熱外不可以冷物逼之得冷即死

中暍悶絶

論曰中暍之病令人悶絶者乃熱毒傷于臟也葢心臟神而惡熱若冐觸暑毒藴蓄于五臟則隂陽不能升降經絡不能宣通故奄然悶絶然真臟未壊救療有方使呼吸之氣宣通即甦亦不宜待其自甦又不可使之犯冷若外犯冷則與熱氣相拒令氣反不通而速斃宜慎

之

熱暍欲死悶氣方

生地汁一鍾

令旋旋灌之即甦

中暑毒熱暍不省方

上白麪

用熱湯和三錢令人灌之即差

中熱不省人事方

大蒜去衣搗爛

用新汲水調和灌之差

又方

以壍泥圍中暍人臍使二三人溺其中不可使流去

此路上無湯可用乃令人溺取溫有湯不必溺也仲

景不云泥及車缸蓋此物必冷暍人忌冷若得熱湯

和泥及火燒平缸可用也

又方

生菖蒲

擣取汁微温一鍾令人灌之愈

又方

掘池作小坑子以蜜半鍾傾坑内入新汲水二三鍾攪勻取起放碗内澄清水漿一鍾灌之差

中熱暍死方

取路上熱塵土以壅其心冷復易之候患人氣通乃止

陳皮湯

陳皮去白炒　黑乾薑　炙甘草一兩

水煎三錢稍冷服勿頓與之中喝垂死備急救生

霍亂吐利　霍亂嘔吐不止　霍亂四逆

霍亂心腹痛

霍亂統論

論曰三焦者水穀之道路氣之所終始也因風冷或飲食傷內至中焦不和則正氣不守而邪得內干揮霍之間

便至撩亂故名霍亂蓋清濁相干于腸胃之間便至撩亂腹痛即利甚者吐利俱發其不吐不利謂之乾霍亂亦以冷食暴爭於中而不得出也然脉必代者以氣不足也脉大能言者為可治若脉微氣劣而不欲言為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃五內悶亂先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛則吐

利俱作治此者當清中焦為本中焦既和則清濁自分而吐利止矣

藿香湯　治吐利不止

藿香五錢　白芷　砂仁一兩　丁香一分

水煎三錢稍熱呷

大豆飲　治吐利不止

大豆　陳皮　香茹　竹茹　前胡　蘆根　枇杷葉

薑水煎五錢服以差為度

理中湯　治霍亂吐利虛冷

人參　白朮三兩　甘草　乾薑二兩

水煎五錢溫服若胸滿腹痛吐下者加川歸紫朴薑炒各二兩

四順湯　治吐下虛冷厥逆腹痛乾嘔

乾薑　人參　甘草二兩　附子一枚

水煎五錢空心溫服　一方下甚者加龍骨二兩

腹痛不止加川歸二兩

香茹丸　治冷熱不調霍亂吐下

香茹半兩　扁豆　木香一兩　丁香皮二兩　益智仁一分　零陵香　藿香五錢

共末糊丸桐子大蘇湯下二十丸

青金散　治吐逆手足厥冷面青諸藥不效者

硫黃一兩溶作汁　水銀一兩與硫汁溶結成沙子

研細用冷木瓜湯下二錢米飲下亦可

和氣煮散　治吐下冷熱不和

胡椒　菉豆一兩　人參一分

共末水煎三錢空心稍熱服日二

霍亂嘔吐不止

論曰霍亂嘔吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣上而不下故嘔吐不止也若上下升降陰陽和平而吐自止矣

藿香　紫朴二兩　人參　白茯　乾薑　青皮　枇

杷葉　半夏薑炒　甘草一兩　丁香五錢　草豆蔻六枚

薑水煎三錢熱服　定嘔逆止心腹刺痛進飲食化痰益氣

香茹湯　治吐逆不止煩悶

香茹陳者一斤　扁豆　紫朴薑汁炒半斤

水酒合煎五錢汲水坐頓冷分二服未效再服

紫朴湯　治嘔吐不思食

紫朴薑汁炒二兩　人参　白朮　半夏薑炒　陳皮一兩

薑棗水煎三錢空心溫服日二

返魂湯　治嘔逆手足厥冷

食鹽一分　生薑一兩

用童便碗半煎一碗分三服

人參湯　治下焦熱氣逆上嘔吐不止名曰走哺

人參　山梔　片芩　知母　萎蕤一兩　白茯　陳

皮　白朮　石膏兩半

薑水煎三錢服日二

四汁煎 治吐嘔不止

生藕汁 生葛汁 木瓜汁一合 生薑汁半合

同慢火煎如餳頻服一二匙含化徐徐津液咽下

藿香散 治吐逆開胃和氣

藿香一兩 人參 丁香五錢 訶勒皮十枚 石蓮心二百枚 糯米三百粒

共末煨生薑大棗煎濃湯下二錢

霍亂四逆

論曰四肢為諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脉微欲絶也古法治四逆專于通脉益榮衛流行氣道升降則手足自和逆者順矣

理中湯　治傷寒霍亂嘔逆四肢厥冷煩悶汗出食不化心腹虛滿拘急短氣

麥冬　乾薑六兩　人參　白术五兩　附子　白茯三兩　甘草四兩

水煎三錢空心温服少頃又服

龍骨湯　治吐利手足逆冷

白龍骨　黑附子一兩　黑乾薑　人參　炙甘草兩半

生薑水煎三錢空心溫服以差為度

霍亂心腹痛

論曰霍亂心腹痛者由脾胃虛弱客風冷之氣使陰陽不和致水穀相并清濁莫分變亂于腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安故名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而嘔吐下搏於陰經則腹痛而瀉利故謂之霍亂心

腹痛也

桂心湯　治心腹痛煩嘔不止

桂心三兩　紫朴薑汁炒四兩　枳實麩炒五兩

薑水煎三錢溫服日二

抵聖散　治霍亂宿食不消心腹疼痛

紫朴薑汁炒四兩　白朮土炒二兩　人參　白茯　高良薑炒

木香　吴茱萸洗炒　草豆蔻　枳殼　甘草　陳皮去白炒一兩

共末空心沸湯下二錢日二

石菖蒲汁湯　治霍亂心腹痛急如中惡

石菖蒲（生者四兩）

水洗擣取汁一鍾分四服熱湯和汁温服

厚朴湯　治霍亂心腹痛煩不止或嘔

紫朴（薑汁炒）　桂心　枳殼（去白炒二兩）　白芍（炒）　檳榔（微煨一兩）

生薑水煎三錢空心温服

縮砂散　治心腹冷痛嘔逆惡心滑泄不止

砂仁　陳麯　白朮　赤石脂　黒乾薑　呉茱萸洗炒　川芎　龍骨一兩

共末熟米飲下二錢

乾霍亂　中惡霍亂　霍亂乾嘔　霍亂轉筋

乾霍亂

論曰乾霍亂之狀中氣喘爭而不吐不利是也葢腸胃挾實與正氣相搏正氣暴衰神志昏冒上下隔塞白汗自出治之稍緩則不可救

鹽便湯　治不吐不利冷汗自出氣悶將絶

食鹽半匙熬　童便一鍾

和勻溫服少頃吐下即愈

紫蘓丸　治乾霍亂

紫蘓　陳皮　人參　桂心　髙良薑一兩

共末蜜丸梧子大　氣滿惡心欲吐不吐乾嘔酒下

二十九日二

人參湯　同上

人參 白茯 紫朴一兩 桂心 甘草 高良薑五錢炒

薑水煎三錢溫服日二

黍米飲 治乾霍亂

黍米二合

水研澄清取白汁呷盡即差

不得吐利方

食鹽一合 汲水一升

同煎令鹽消服之吐出涎沫便愈如不吐又如上法飲之令吐佳

活命飲　治脾元虚損霍亂不吐利腹脹如鼓心胸痰壅

食鹽一合　生薑　葛根五錢　丁香七枚　炙甘草一分

作一服用童便煎溫分二服未差再服

中惡霍亂

論曰中惡霍亂者由客邪内干正氣暴亂使胃中食物

不化氣道否澀不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚

則精神冐昧靡所知識此得之鬼氣所作也

麝醋方　治中惡霍亂

麝香 細研一錢 米醋 半鍾

共和勻分二服

白术湯　治中惡吐利手足麻痺轉筋

白术 土炒 人參　木瓜 一兩 炙甘草　黑乾薑 五錢

生薑大棗水煎三錢溫服日二

霍亂乾嘔

論曰霍亂乾嘔者胃氣逆也本於吐利之後脾胃俱虛三焦不理氣時逆上但嘔逆而無所出故名乾嘔

木瓜湯 治乾嘔

木瓜一枚去瓤 人參 乾薑一兩 紫朴五錢

水煎五錢溫服日二

薤白湯 治乾嘔不止

薤白一把切

水煎二服以止為度

厚朴湯 治胃弱嘔吐不止

紫朴四兩 白朮五兩 人参 白茯三兩 扁豆葉乾二兩

水煎五錢服

霍亂轉筋

論曰霍亂轉筋者緣風冷傷于三焦傳于脾胃脾胃得冷則陽氣不得宣行致四肢筋絡不得舒緩此由中氣不足其候胃悶不安脛筋攣結腨肉緊痛反急于上盔

足陽明之經膀胱之脉寒也然足陽明之脉其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兎下入膝臏中下循髀外廉足太陽之經其脉循髀外後廉下合膕中貫腨內是動則病髀不可曲轉膕如結腨如裂治宜調胃腑溫膀胱則小水得宣行寒冷自下胃腑溫和霍亂可愈轉筋之疾無由作也

川椒湯　治轉筋

川椒一分炒出汗　烏梅肉七枚炒

水煎入蜜少許頓服老人亦可

肉豆蔻湯　治霍亂轉筋

肉豆蔻麪煨熟　人參二兩　桂心　吳茱萸洗炒一兩

薑水煎三錢服

雞屎白湯　治轉筋悶絶欲死

鷄屎白一合炒　胡椒二十粒　木瓜六兩　白朮　桂心　烏

良薑一兩　生薑六兩

水煎五錢溫服日二

木瓜湯　治轉筋吐利不止

木瓜一兩　青蚨銅錢四十九枚　烏梅肉炒五枚

水煎分二服

藘香子散　治吐利轉筋煩悶

木瓜一兩　藘香子炒　人參　陳皮五錢　甘草　石菖蒲一兩

共末冷米飲下三錢頃再下

生薑酒　治轉筋入腹欲死

生薑五兩切片

酒一升煎八合頓服差

雞屎白湯　同

雞屎白炒一兩研

水煎二錢頓服勿令病人知

附子湯　治轉筋淋足

附子一枚　葱白半斤　生椒綿裹　生薑切各一分

水一斗煎數沸去滓以鹽漿水解之淋洗立差

鹽搨法　同

食鹽三合

水五升煎三升浸青棉布搨轉筋上

苦酒絮裹足法　同

苦酒二升

以絮内酒中煮酒裹患處差

又方

木瓜二枚切

水煎湯以青棉布浸裹

神聖香薷飲　治胃氣虛霍亂吐利轉筋腹痛

香薷穗兩半　川連微炒　紫朴薑汁炒二兩　白扁豆炒一兩

用生薑汁四兩慢炒連朴紫黑色入二味同搗粗末

酒水合煎五錢用器乘入井中浸冷連進二服至死

者亦可救

治轉筋方

糯米二兩　人參　生甘草　乾薑二錢

共為末用新汲井水下三錢以差為度

聖濟總録纂要卷五

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷六

詳校官太醫院御醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣李惟清

聖濟總録纂要卷六

休寧程林纂

泄痢門

泄痢統論

論曰脾與胃合其象土外榮肌肉内熟水穀風寒水濕襲於外則留連肌腠傳于脾胃若飲食不節害於内腸胃乃傷不化糟粕皆能為病所得之源不一故立名多

瑞且火風入中則為飧泄濕勝則為濡瀉寒中則為洞泄暑勝則為毒痢而又或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或疳或蠱之類種種不同悉由養攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以治

水瀉

論曰内經謂諸厥洞泄皆屬于寒暴注下迫皆屬于熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲

留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢有如注水之狀謂之注泄名為水瀉

紫朴散　治一切水瀉冷痢

紫朴　白朮　乾薑一兩　甘草五錢　陳皮三分

共末飲下三錢日二霍亂吐瀉新汲水下

肉豆蔻散　治水瀉無度腸鳴腹痛

肉蔻一兩　薑汁二合　白麪二兩

將蔻為末用汁和麪裹末煨熟飲下二飲

黄蠟丸　治水瀉不止傷冷虛極

硫黄　黄蠟一兩

研硫化蠟和匀丸梧子大汲水下五丸

紫朴散又方　治暴水瀉不止

紫朴一兩　白术　川連　甘草　赤茯　乾薑　白

豆蔻三分　訶勒一兩

共末飲下二錢

訶梨勒丸　治水瀉腸滑不禁

訶勒　龍骨　乾薑　赤石脂一兩

共末糊為丸如梧子大飲下二十丸

正氣散　治水瀉腹痛日夜不止

砂仁　附子　白朮　人參　龍骨　石榴皮

甘草　肉蔻　吳萸　地榆　乾薑　赤石脂一兩

共末飲下三錢

又方　治水瀉水穀不化日夜不止

熟艾半斤

慢炒合熟色裹坐之冷再炒

濡瀉

論曰内經云濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉夫脾為五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣内客于脾則不能俾助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

肉豆蔻散　治腸胃受濕濡瀉不止

肉蔻　川連　訶勒三分　白术　甘草　赤茯　乾

薑五錢　紫朴一兩

共末飲下二錢

又方　治腸胃受濕濡瀉不止

紫朴　甘草一兩　肉豆蔻五枚

共末飲下二錢日二

附桂丸　治濡瀉水痢不止

桂心　附子一兩　乾薑　赤石脂二兩

共末蜜丸梧桐子大飲下二十丸

白术丸　治脾胃受濕濡瀉不止

白术　人參　乾薑炒黑三分　紫朴用生薑仝炒一兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

生薑黄連散　治水瀉久泄瀉

生薑四兩　川連一兩咀片

將薑切片與連仝入鍋慢炒薑赤色去薑用連為末

臘茶下二錢二服止

飧泄

論曰內經云清氣在下則生飱泄又曰久風為飱泄夫脾胃土也其氣冲和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故冲氣不能化而食物完出夕食謂之飱以食難化者尤在于夕故食不化而泄出則謂之飱泄此俗所謂水穀痢也

白术湯　治風冷入中飱泄不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛

白术　紫朴　熟艾　龍骨　川歸一兩

薑水煎三錢溫服

洞泄寒中

論曰内經云謂長夏苦病洞泄寒中洞泄者謂食已即泄乃飱泄之甚者此因春傷于風邪氣留連至夏發為飱泄至長夏發為洞泄葢當春之時陽氣在表為風邪所中入客于經未至臟腑夫風者陽氣也東方木也木能勝土脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽必陰病在脾胃故為飱泄陰生于午至未

為甚是長夏之時脾土當旺脾為陰中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生內寒故令人臟腑內洞而泄是為洞泄寒中之病

附子丸　治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食已即出食物不消

附子　烏梅肉一兩炒　川連二兩炒　乾薑一兩半炒

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

溫中丸　治脾胃虛寒洞泄不止

附子　乾薑　龍骨　硫黄　肉豆蔻二兩

共末糊丸梧子大食前艾湯下二十丸

大輪散　治脾胃氣寒大腸虚滑日夜不止

附子一枚　肉蔻五錢　乾薑一分

共末空心飲下二錢

鶩溏

論曰脾氣衰則鶩溏葢陰中之至陰脾也為倉廪之官若脾胃氣虚弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則臓寒

致糟粕不化故大便色黑狀如鶩溏也又大腸有寒亦令鶩溏

吴茱萸丸　治脾氣不足鶩溏青黑

吴萸　乾薑　陳麯　川歸　赤石脂三分　紫朴一兩

共末蜜丸梧子大飲下二十九

龍骨黃連湯　治脾氣不足鶩溏青黑

龍骨五色者一兩煅　川連三分薑汁炒　川歸　乾薑　甘草炙五

錢

薑水煎三錢空心溫服日二

白滯痢　冷痢　熱痢　赤痢

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液相摶結滯如膿或如凝脂而下故曰滯痢

人參湯　治白滯痢及小便色白

人參　龍骨　白茯　川歸　甘草　乾薑五錢　紫

朴一兩

水煎五錢溫服日二

赤石脂散　治白滯痢

赤石脂一兩　乾薑三分

共末飲下一錢未差再服

薑附子丸　治臟寒下痢白膿心腹痛

乾薑　附子　龍骨　訶勒皮一兩

共末飲下二錢

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒即久冷痢有膿也

牡蠣湯 治冷痢腹痛

牡蠣燒紅醋淬 白朮 川歸 乾薑 龍骨煅三兩 赤石脂一兩 附子炮去皮臍 人參 白芍 甘草五錢

水煎三錢溫服若下膿加紫朴嘔逆加陳皮

肉豆蔻丸　治冷痢青白色黑者

肉豆蔻　炙甘草二兩

水煎三錢溫服日二

訶勒湯　治脾胃虛冷下痢滑泄不思食及一切冷氣

訶勒　紫朴　白朮　甘草　陳皮　草豆蔻一兩

生薑大棗水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸　治冷痢下膿血臍腹痛脹滿食不化

吳茱萸 乾薑兩半 紫朴 川歸四兩 陳麴 赤石脂一兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

赤石脂丸 治多年冷痢飲食不化或青或黃四肢沉重起即目眩手足逆冷

赤石脂 熟艾一兩 乾薑 川椒炒出汗兩半 烏梅肉炒五兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

四白散　治一切冷痢

白龍骨　白石脂　胡粉炒　枯礬五錢

共研極細飲下二錢

熱痢

論曰凡痢色黃赤並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱氣乘虛入客于腸間故其症下痢兼黃赤或血雜下腹中熱小便赤澀身熱煩渴故名曰熱痢

生地黃湯　治熱痢不止

生地五錢 甘草一分 地榆三分

水煎三錢空心温服日二

甘草湯 治夏月暴下熱痢

甘草五錢 生薑一分 白蜜一合

漿水五合煎分二服日二

蒲根湯 治熱痢

蒲根二兩 粟米二合

水煎三錢温服日二

黃連湯　治熱痢腹痛日夜百行氣欲絶者

川連一斤　附子一兩　白术　龍骨　赤石脂　乾薑

阿膠　川歸一兩

水煎五錢空心温服日二

赤痢

論曰熱痢之盛者為赤痢本由腸虚為風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虚必湊滲入腸中與痢相雜其色純赤名為赤痢若腸虚不復則又為久赤痢變成嘔

噦疳懸之候矣

黄柏丸 治痢下黄赤水或黄赤膿四肢煩皮膚冷

川柏 片芩一兩 川連二兩 熟艾五錢

共末蜜三兩蠟一兩化丸梧子大飲下二三十丸

六神湯 治赤痢腹痛或下純血

川連 車前子二兩 陳皮去白一兩 炒山枝 甘草炙 地

榆五錢

水煎五錢空心温服日二

血痢　膿血痢　赤白痢

血痢

論曰邪氣客於血脉之中腸胃虛弱血隨熱行流滲腸間因便血下故名血痢其脉見虛小者生身熱疾數者難

治

茜根湯　治痢下鮮血

茜根　川連　地榆一兩　山枝二十一枚　犀角一分剉末

水煎三錢入薤白三寸香豉一撮温服

艾葉飲　治血痢不能止小腹刺痛

艾葉　川連　川歸　龍骨　訶勒皮二兩

水煎三錢溫服

三物散　治一切血痢

胡黃連　烏梅肉　竈下土一兩

共末茶下二錢

葛粉飲　治血痢日夜無度

葛粉　白蜜一兩

汲水四合和勻服

地榆湯　治血痢日夜無度

地榆二兩　甘草炙五錢

水煎五錢溫服日二

人參散　治一切血痢腹痛

人參　肉豆蔻　烏魚骨二兩

共末飲下二錢

通聖散　治血痢腹痛日夜無度

大棗去核 烏梅肉七枚 甘草一尺 乾薑三錢

共末薑棗水煎三錢服

膿血痢

論曰春傷于風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘之則血隨熱行滲入大腸與腸中津液相搏致積熱結血化為膿膿血相雜故成膿血痢秋冬診脾脉微澁者是也其脉滑大或微小沉細虛遲者皆生若懸絶或實疾或數大身熱者皆死

黃連丸　治下痢膿血羸瘦

川連　龍骨　苦參　紫樸一兩　熟艾　枯礬　赤石脂　甘草　陳麴　乾薑五錢

共末蜜丸如梧子大飲下二十丸

柏葉丸　治膿血久痢腹痛

側柏葉　川黃連　阿膠　地榆　川歸五錢

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

乾薑丸　治膿血痢日久不止

乾薑　川連　川柏一兩　附子　甘草　熟艾　烏

梅肉三分

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

二宜散　治新久痢下膿血

川連　吳茱萸二兩

各製為末赤膿多萸末一錢連末倍之白膿多連末

倍于萸末俱飲下

赤白痢

論曰赤白痢者由腸胃虚弱冷熱相乘客于腸間變而為痢蓋熱乘于血流滲腸内即赤冷氣入搏津液凝滞則白其候裏急後重數至圊而不能便膿血相雜故名赤白痢重者狀如膿涕而血雜之輕者血膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢

黄連散 治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱

川黄連炒三分 白术 片芩 甘草 乾薑 川歸

烏梅肉五錢 阿膠一兩

共末水煎三錢温服

白术丸　治赤白痢及水穀冷熱氣痢

白术　川歸　龍骨　犀角　赤白脂　烏梅三分

紫朴　川連一兩　乾薑　甘草五錢

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

烏梅散　治赤白痢久不止腹痛下血脱肛

烏梅肉　川歸　地榆　赤石脂　川連　樗根

白皮五錢　乾薑三分　甘草一分

共末飲下二錢

加減薑黃丸　治冷熱赤白痢

乾薑　川連炒一兩

各末糊丸各收　白痢冷瀉薑丸三十丸　連丸減半空心飲下　赤痢下血薑丸十五連丸倍之　赤白相雜薑連各半

龍骨散　治赤白痢腸胃虛滑

龍骨五錢　川連　牡蠣一兩　烏梅肉三分

共末飲下二錢

阿膠丸　治赤白痢

阿膠　枳殼五錢　川連　白芍　木香半炒生　訶勒皮

乾薑　甘草一兩　川歸　地榆兩半

共末酒糊丸梧子大飲下二十丸

黃連散　治赤白膿血痢

川連　龍骨二兩　人參三分　地榆　紫朴　乾薑一兩片

芩一兩　赤石脂兩半

共末飲下二錢

艾葉丸　治赤白痢多痛不可忍

艾葉　木香半生半炒　川連　肉豆蔻三分　地榆一兩　阿膠蛤粉炒　川歸五錢

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

阿膠丸　治赤白痢腹痛不止

阿膠三兩　川連二兩　胡粉　川歸一兩

共末糊丸飲下二十丸

黃連丸　治赤白痢不問遠近

川連　川柏　赤茯　當歸一兩

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

四神散　治赤白痢後重腸痛

川連　乾薑　川柏　川歸一兩

共末烏梅湯下二錢赤痢加黃柏　白痢加乾薑

後重腸痛加黃連　腹痛加當歸大凡泄痢宜食酸苦益酸收苦堅故也

木香散　治一切赤白痢

木香　檳榔　肉蔻一兩　乾薑五錢

共末飲下二錢

和中散　治冷熱痢腹痛裏急

附子　川連一兩　乳香一分

各為末冷痢熱痢連附末共一錢乳末一字飲下末止用青皮湯再下一服　赤痢附末五分連末倍之乳末一字白痢附末一錢連末減半乳末仝前

黑豆湯 治赤白痢服藥不止

黑豆半升炒去皮為末四合 甘草一兩

用綿裹入湖水三升煎一升分二服

白礬丸 治赤白痢

白明礬 鉛丹二兩

仝入瓶中封固火煆為末糊為丸如梧桐子大飲下

一二十丸

氣痢 休息痢 蠱痢 久痢

氣痢

論曰氣痢者由冷氣停于腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脅虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名為氣痢治宜厚腸胃調冷熱補脾氣痢當自愈

縮砂丸　治氣痢胃與腸虛不能制伏日夜無度黃瘦食不生肌困重無力眼目昏澁多年不愈

砂仁　陳皮　川歸　赤石脂一兩　川連二兩　肉豆蔻五錢

共末蜜丸梧子大飲下二三十丸

黄連丸　治久氣痢不止或差或劇

川連　川歸　烏梅肉　訶勒皮一兩

共末蜜丸梧子大厚朴湯下二三十丸日二

猪肝丸　治冷勞氣痢久不差

雄猪肝一具去筋膜切　陳皮　烏梅肉　乾薑　訶梨勒煨取皮　桂心　川歸一兩　川連　紫朴二兩　薑炒　大蒜二枚　煨熟

共末用肝蒜研糊丸梧子大飲下二十丸

木香丸　治氣瀉不止

木香　丁香　砂仁　肉豆蔻一兩　赤豆脂　訶梨勒五錢　煨　藿香五錢

共末糊丸梧子大飲下三十丸

木香丸　治一切氣痢不止

木香　肉豆蔻　砂仁　赤石脂五錢

共末用棗肉為丸如梧子大飲下三十丸

香艾丸　治氣痢腹痛臥眠不安

熟艾 陳皮一兩

共末酒糊丸梧子大鹽湯下二十丸

烏梅丸 治氣痢不止瘦劣痢成冷勞

烏梅 草蔻 紫朴一兩 甘草 川歸 訶勒皮

肉蔻 乾薑 蓽撥三錢 桂心五錢 猪肝一大葉醋煮研糊

共末肝糊丸如梧子大飲下三十丸

木香砂仁散 治氣痢腹脹虛鳴

木香二兩五錢 砂仁兩半 枳殻 訶勒皮三兩

共末飲下二錢

肉豆蔻散　治氣痢腹脹不下食

肉蔻　訶勒　木香一兩仝上俱半生半炒　甘草　白术三分

蓽撥　乾薑五錢

共末飲下二錢

蓽撥煎　治氣痢久不差及諸痢困弱者

蓽撥三錢研末　牛乳半升

慢煎其半頓服神効

休息痢

論曰腸中宿挾固滯每遇飲食不節停飲不消即作差作發故取名為休息痢治藥當加之以治飲消削陳寒痼滯之劑即愈

阿膠湯 治休息痢

阿膠 川連 龍骨一分 艾葉五錢 倉米二合炒

水煎三錢温服

黄丹散 治休息痢諸藥無効

黃丹三兩炒 棗肉三十枚全丹擣紙包煨研末 川連 枳殼五錢

共末飲下

砂仁丸 治休息痢

砂仁一兩 肉豆蔻五錢 羊肝半斤切

共末拌勻麪包紙裹煨熟研米糊丸梧子大飲下三十丸

黃連湯 治休息痢

川連 龍骨五錢 熟艾 阿膠五錢

水煎三味去滓入阿膠再沸分二服每服後濃煎艾湯飲之

玉液丹　治休息痢

枯礬二兩　硫黄　硝石五錢

仝研化研末糊丸小豆大飲下一二十丸兼治腸風下血

砂仁丸　治冷氣腹痛不止休息氣痢勞損消化水穀温脾胃冷滑下痢不禁

砂仁　附子　乾薑　紫朴　陳皮　肉豆蔻五錢

共末蜜丸梧子大飲下二三十丸

四神丸　治多年休息痢者

川歸　龍骨五錢　川連一兩　烏梅肉二枚

共爲末用薤白取汁杵丸小豆大温水下二十丸

當歸丸　治多年休息痢

川歸　川連　烏梅肉一兩

共末薑汁丸梧子大厚朴湯下二十丸

金石散　治多年休息痢

石灰（風化者）　鉛丹（炒一分）　糯米（炒黑一合）

將灰丹仝入鍋慢炒一炊久入米仝研末空心飲下二錢

蠱痢

論曰凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鴨肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脉漸至臟腑毒氣挾熱與血相搏客于腸間如病蠱注之狀

故名蠱痢

茜根飲　治蠱痢下血如雞鴨肝腹痛難忍

茜根　升麻　片芩　犀角　川栢　桔梗三分　白

蘘荷　地榆一兩

水煎三錢溫服

升麻湯　治毒痢下血片臍下刺痛

升麻　地榆　片芩　茜根兩半　犀角一兩　山枝二十一枚

水煎五錢入生地薤白香豉溫服日二

久痢

論曰久痢不差則元氣日耗腸胃損傷濕氣散入肌肉浮腫以胃土久虛故也蟲因虛動上食于膈則嘔逆煩悶下蝕腸中則肛門瘡爛久而不差變成疳䘌或下赤汁水血相半腥不可近者是謂五臟俱損其病難治

紫朴湯　治久痢經年不差

紫朴　川連　熟艾　乾薑　阿膠炒　石榴皮炒一兩

水煎三錢溫服

茯苓丸　治久痢脾胃虛弱食不消腸鳴痛

白茯　龍骨　川歸　乾薑　川栢　赤石脂三分

陳麯　川連一兩　附子　人參　甘草

共末蜜丸如梧子大飲下二十丸

黑神散　治腸滑久痢神効無比

酸石榴一枚劈四塊火燒爐盡不令作灰碗蓋存性出火毒

研末水煎石榴一瓣取汁下二錢　久瀉亦治

久痢不止

生薑切一兩　砂糖一兩

拌匀紙煨五更初作一服以臘茶嚼下

泄痢門

下痢裏急後重

論曰下痢裏急後重者有瘕聚也經所謂大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛是矣法當和氣而袪蘊滯則脾胃平和飲食腐化膿血自消大腸自固也

當歸黄連湯　治後重下赤白滞下腹内結痛

川歸　犀角　赤茯三分　川連一兩半　甘草五錢　紫朴　地榆一兩

薑棗水煎三錢溫服

聖功散　治冷熱不和下痢赤白臍腹痛裏急後重

乾薑　五倍子一兩　甘草　訶勒皮五錢

共末飲下二錢

白頭翁湯　治熱痢下重

白頭翁　川連　川栢　秦皮三兩

水煎三錢温服

當歸湯　治冷痢裏急後重

川歸酒炒　胡椒　乾薑　阿膠一兩　川連　紫朴二兩

共末醋熬膠末為膏丸梧子大陳皮湯下二十丸

通神丸　治膿血雜痢後重疼痛久不差

沒藥　乳香　五靈脂一錢　巴霜五分

共研水丸小豆大木瓜湯下五七丸　小兒減半

痢後脫肛

論曰下痢脱肛者因大腸虚弱冷氣偃滯致不能便極力于下肛門脱出故名脱肛温其藏則愈古方有坐湯温熨之藥皆良法也

黒聖散　治痢久脱肛痛

大蜘蛛一枚入泥合燒黒色勿太過

研末入黄丹少許先用白礬葱椒湯洗拭乾滲藥在軟帛上挼托肛頭即不下

猪肝散　治洞瀉脱肛

猪肝一片炙　川連　阿膠　川芎一兩　烏梅肉二兩　艾葉醋炒五錢

共末酒下二錢

壁土散　治脫肛

故室東壁上土五合　皂莢三枚

共末傳肛上取皂莢灰煖更互熨入

枳實熨方　治積冷下痢脫肛

枳實一枚

石上磨令滑澤鑚安柄子蜜塗炙令煖熨之冷易肛入即止　一方以猪脂和蒲黄傅肛上手挼令入日二三愈

痔䘌

論曰痔有五種久變為蟲蟲䘌一曰白痔令人皮膚乾燥而無潤澤之氣二曰赤痔令人毛髪枯焦三曰燒痔令人腰脊强重四曰痔悪令人下部攣急背强不能俯仰五曰黒痔患者必死令人五臟俱損或下瘀血此蓋

腸胃俱虚嗜肥甘過度致脾胃緩弱穀氣衰微衛氣虚損腸間諸蟲因虚而動蝕于上則手足煩疼心中懊嘿嘿不欲飲食腰脊無力食不知味精神恍惚夜夢倒顛咽喉生瘡齒齗黒點損爛膿血俱出胃氣逆則變嘔噦下蝕腸胃便痢膿血或下痰黒久不已則肛門爛開漸至危殆

治積年疳痢面黄瘦

硫黄　川連　熟艾一兩　白蜜一合

水一升煮連艾取汁入黄末數沸綿濾過入蜜數沸分三服

痔痢久不差羸瘦欲死

羊屎一升

水一斗浸一宿明旦絞汁頓服至日午惟食水煮飯極重不過三服差

二白湯 治久痢變痔下部生惡瘡惡寒壯熱

桃白皮 槐白皮一升 苦參五合 大棗十枚 熟艾五合要五月五

日取者方炒

用水五升煮半入熊胆一棗大攪勻以一升灌下部餘分三服

治久痢成疳　百方不差

丁香　麝香　川連一分

共末用竹筒吹入下部

溼䘌

論曰凡下痢不止或𤼵之餘為水溼所乘客于腸胃令

九蟲皆動侵蝕臟腑故為溼䘌之病所謂䘌者蟲動于
匿而難尋故也謂蟲因溼而動故名溼䘌其症上蝕唇
口下食肛門上唇生瘡是蟲蝕五臟令人心煩懊憹下
唇生瘡是蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛氣逆則變
為嘔噦甚則臟腑被傷齒上下齗皆生瘡齒色暗黑是
其候也下痢出瘀血者不可治

黄連湯　治疳溼䘌蝕口齒及下部

川連四兩　熟艾二兩　苦參　槐白皮三分

水煎五錢重者不過三服

猪膽煎　治痔蟨下部上攻除熱殺蟲

猪膽一枚　米醋五合


煎醋百沸入膽汁再熬滿口飲之蟲死差

塗方　治痔蟨無問所在皆治

死蝦蟆一隻燒灰

研末麻油和塗患處

丁香散　治痔溼蟨洗熨下部



丁香一分麝香一錢甘草犀角三分

右共末以鹽椒各三合豆二合水三升煮乘熱用用綿

蘸洗熨

聖濟總録纂要卷六